



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Лакто - Стопа для подавления лактации и устранения симптомов ложной щенности у собак.

(организация-разработчик ООО «АПИ-САН», г. Москва)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Лакто - Стоп (Lacto-Stop).

Международное непатентованное наименование действующего вещества: каберголин.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Лакто - Стоп в 1 мл в качестве действующего вещества содержит каберголин - 50 мкг, а в качестве вспомогательного вещества триглицериды средней длины цепи (MCTs) до 1 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор слегка желтоватого цвета.

3. Препарат расфасовывают по 5, 7, 10, 15 и 20 мл во флаконы из тёмного стекла укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками или в тёмные полимерные флаконы с прокладками из полиэтилена высокого давления с навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Срок хранения после вскрытия флакона - 28 дней.

Запрещается применение Лакто - Стопа по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

5. Лакто - Стоп следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Лакто-Стоп относится к гипопролактинемическим препаратам.

Каберголин, является производным алкалоидов спорыны, относится к агонистам дофаминовых рецепторов пролонгированного действия. Обладает стимулирующей активностью на дофаминовые рецепторы гипоталамо-гипофизарной системы, участвующей в секреции основного гормона лактогенеза пролактина и оказывает тормозящее влияние на его выделение. Влияния на другие эндокринные процессы не оказывает.

Использование Лакто-Стопа предотвращает и подавляет лактацию, увеличение молочных желез и профилактирует развитие лактационного мастита. Снижение уровня пролактина способствует быстрому исчезновению признаков ложной беременности, а также изменений в поведении животного.

Равновесная концентрация каберголина при многократном приеме в течение недели превышает таковую после однократного приема в 2–3 раза. Каберголин выводится почками и кишечником (22% и 60% соответственно) в течение 20 дней; менее 4% обнаружено в моче в неизмененном виде. Связывание с белками плазмы не зависит от плазменной концентрации и составляет 40–42%. Время наступления максимального эффекта составляет 48 ч, продолжительность действия каберголина после однократного применения достигает 14 дней, для достижения длительного терапевтического эффекта необходимо продолжить применение препарата в течение 4–6 дней.

Лакто-Стоп по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Лакто-Стоп назначают для подавления лактации и устранения симптомов ложной щенности у собак по клиническим показаниям (например, ранний отъем щенков), а так же при гиперпролактинемии, идиопатической или вызваннойadenомой гипофиза.

9. Запрещается применение Лакто-Стопа во время беременности из-за вероятности абортов. Не рекомендуется использовать препарат лактирующим самкам, а так же при пониженном давлении из-за возможного усиления гипотензивного эффекта препарата.

10. Препарат применяют внутрь вместе с кормом или принудительно на корень языка в дозе 0,1 мл (3 капли) на 1 кг веса животного 1 раз в день в течение 4 – 6 дней.

11. При передозировке возможны: отечность слизистой оболочки носовой полости, сонливость, кратковременная потеря сознания. В случае передозировки проводят поддерживающую симптоматическую терапию.

12. При первом приеме препарата возможны гиперсаливация и рвота, проходящие самостоятельно без применения лекарственных препаратов.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата, его применение возобновляют при первой возможности, в тех же дозировках и по той же схеме.

14. При применении Лакто-Стопа в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. Очень редко у некоторых животных в первые два дня лечения могут наблюдать отсутствие аппетита, сонливость, что не требует отмены препарата.

15. Не следует применять Лакто-Стоп одновременно с антагонистами дофаминовых D2-рецепторов (производные фенотиазина, бутирофенона, тиоксантина, метоклопрамид). Следует с осторожностью применять одновременно с препаратами, обладающими гипотензивным эффектом.

16. Лакто-Стоп не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с препаратом Лакто-Стоп следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Лакто-Стопа следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «Апи-Сан»; 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3/1, кв. 222.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ». Номер регистрационного удостоверения